WAAR GAAT DE REIS NAARTOE?

EN WELKE ONVERWACHTE ONTMOETINGEN STAAN UW DIER TE WACHTEN?[1]

VLOOIEN
Vlooien zitten overal en kunnen zowel mensen als dieren met lintworm besmetten *(D. caninum)*

SLAKKEN
Honden en katten kunnen zich besmetten met longworm* door in contact te komen met slakken (en slijm)

TEKEN
Teken kunnen meerdere ernstige ziekten overdragen:
- de ziekte van Lyme (borreliose)
- ehrlichiose & anaplasmose
- hepatozoönose & babesiose
- teken-encefalitisvirus (TBE)

ZANDVLIEGEN
Deze bloedzuigende kleine mugjes zijn overdragers van een erg vervelende ziekte:
- leishmaniose

MUGGEN
Muggen zitten eigenlijk overal. Getoond zijn die gebieden waar muggen overdragers zijn van:
- hartworm* *(D. immitis)*
- subcutane dirofilariose *(D. repens)*

PARASIETEN EN ZIEKTEN HOUDEN ZICH NIET AAN LANDSGRENZEN. ZORG VOOR DE JUISTE BESCHERMING!

*Hartworm en longworm zijn potentieel dodelijke aandoeningen

LET OP!

REIST U MET UW DIER NAAR HET BUITENLAND?
DAN IS EEN VACCINATIE TEGEN HONDSDOLHEID VERPLICHT![2]



1. Praktische regelgeving over reizen met gezelschapsdieren kan u terugvinden op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu https://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/dieren/houden-en-verkeer-van-dieren/reizen-met-gezelschapsdieren

2. Voor sommige landen is bijkomend een gezondheidscertificaat vereist

http://www.esccap.eu

BeNeLux
Anaplasmose
Babesiose
Longworm
Lyme borreliose
Teken-encefalitis-virus (TBE)

Bulgarije
Anaplasmose
Babesiose
Ehrlichiose
Hartworm
Leishmaniase
Lyme borreliose
Subcutane Diro-filariose

Duitsland
Anaplasmose
Babesiose
Longworm
Lyme borreliose
Subcutane Diro-filariose
Teken-encefalitis-virus (TBE)

Frankrijk
Anaplasmose
Babesiose
Ehrlichiose
Longworm
Hartworm
Hepatozoönose
Leishmaniase
Lyme borreliose
Subcutane Diro-filariose
Teken-encefalitis-virus (TBE)

Griekenland
Anaplasmose
Babesiose
Ehrlichiose
Longworm
Hartworm
Hepatozoönose
Leishmaniase
Subcutane Diro-filariose
Teken-encefalitis-virus (TBE)

Hongarije
Babesiose
Ehrlichiose
Longworm
Lyme borreliose
Subcutane Diro-filariose

Italië
Anaplasmose
Babesiose
Ehrlichiose
Longworm
Hartworm
Hepatozoönose
Leishmaniase
Lyme borreliose
Subcutane Diro-filariose
Teken-encefalitis-virus (TBE)

Kroatië
Babesiose
Ehrlichiose
Hartworm
Leishmaniase
Lyme borreliose
Subcutane Diro-filariose

Oostenrijk
Anaplasmose
Babesiosis
Lyme borreliose
Teken-encefalitis-virus (TBE)

Polen
Anaplasmose
Babesiose
Longworm
Lyme borreliose
Subcutane Diro-filariose
Vossenlintworm

Scandinavië en Finland
Anaplasmose
Longworm
Lyme borreliose
Teken-encefalitis-virus (TBE)

Slovakije
Babesiose
Ehrlichiose
Longworm
Hartworm
Lyme borreliose
Subcutane Diro-filariose

Slovenië
Anaplasmose
Babesiose
Hartworm
Lyme borreliose

Spanje en Portugal
Anaplasmose
Babesiose
Ehrlichiose
Longworm
Hartworm
Hepatozoönose
Leishmaniase
Lyme borreliose
Subcutane Diro-filariose

Tsjechië
Anaplasmose
Hartworm
Lyme borreliose
Teken-encefalitis-virus (TBE)

Turkije
Babesiose
Ehrlichiose
Hartworm
Hepatozoönose
Lyme borreliose

Verenigd Koninkrijk en Ierland
Anaplasmose
Longworm
Lyme borreliose

Zwitserland
Anaplasmose
Babesiose
Longworm
Lyme borreliose
Subcutane Diro-filariose
Teken-encefalitis-virus (TBE)

Boehringer Ingelheim