



# DIERENKLINIEK HERCKENRODE

Holrakerstraat 15 - 3511 Kuringen – 011/25.61.34  
[info@dierenartsenherckenrode.be](mailto:info@dierenartsenherckenrode.be)

## Vaccinatie kat

### Waarom vaccineren?

Niet gevaccineerde katten lopen risico op ernstige infectieziekten, die levensbedreigend kunnen zijn. Door uw kat een vaccinatie te geven, kan u hem/haar een optimale bescherming geven tegen deze ziekten.

### Wat is een vaccinatie?

Een vaccin zorgt voor de opbouw van een afweersysteem (via antistoffen) tegenover een welbepaalde ziekteverwekker. Wanneer uw kat de volgende keren met deze ziekteverwekker in contact komt, zal hij/zij tegen de ziekte beschermd zijn.

### De voornaamste ziekten die voorkomen bij de kat

#### ***Kattenziekte***

Een zeer besmettelijke virusaandoening die een hoog sterftcijfer kent. Typische symptomen: algemene loomheid, koorts, braken, waterige tot bloederige diarree. Ook het beenmerg en de lymfeklieren kunnen aangetast worden. Dit geeft aanleiding tot een daling van de weerstand waardoor andere ziekteverwekkers (virussen en bacteriën) vrij spel krijgen.

#### ***Niesziekte of 'kattengriep'***

Meerdere ziekteverwekkers (virussen) spelen bij deze luchtwegaandoening een rol. De voornaamste symptomen zijn: vermoeidheid, niezen, neusvloeï en tranende ogen, oogontsteking en koorts. In sommige gevallen heeft de kat last van pijnlijke zweren in de mond, die de voedselopname kunnen belemmeren. Katten die herstellen van deze 'kattengriep', blijven drager van deze virussen. Ze blijven dus deze ziektekiemen verspreiden en de ziekte kan ook op latere leeftijd, wanneer de kat zwak/ziek is, terug naar boven komen.

#### ***Kattenleucose***

Leucose is één van de belangrijkste ziekten en doodsoorzaken bij katten! Het leukemievirus verspreidt zich door onderling contact. De tijd tussen de infectie en het ontstaan van de ziekte kan zeer lang zijn (soms jaren). Een kat die besmet is met dit virus kan er dus perfect gezond uitzien, maar vormt wel een groot gevaar voor haar soortgenoten.

De ziekte tekens zijn zeer uiteenlopend. Enkele klachten die vaak voorkomen zijn: bloedarmoede, diarree, zwakte,... Met behulp van een bloedonderzoek, kunnen we de diagnose stellen.



## ***Hondsdolheid (rabiës- razernij)***

Een virus dat levensgevaarlijk is voor alle warmbloedige dieren (hond, kat,..), ook de mens! Een kat die besmet is met dit virus, in tegenstelling tot de hond, zal eerder wegkruipen en slechts in erg uitzonderlijke gevallen bijten.

Het virus komt via het speeksel in een wondje in het lichaam terecht, en verspreidt zich langs de zenuwbanen naar de hersenen, waardoor het dier sterft binnen de 6 maanden. Verspreiding kan ook gebeuren via speeksel (bijtonden) van vossen, dassen en andere dieren.

**Vaccinatie tegen hondsdolheid is verplicht voor elke kat die over de landsgrenzen heen reist.** Gaat u dus met uw kat naar het buitenland (al is het maar voor een korte periode), of komt uw kat vanuit het buitenland naar u, dan moet hij/zij gevaccineerd zijn. In België is ten zuiden van Sambre en Maas en op campings, vaccinatie tegen rabiës NIET MEER wettelijk verplicht. Soms worden door bepaalde landen (Groot-Brittannië, Ierland, Malta, Finland,..) nog extra verplichtingen ingesteld. Raadpleeg hiervoor uw dierenarts.

Het bewijs van vaccinatie wordt in het Europees paspoort genoteerd door de dierenarts en is, voor de meeste Europese landen, 3 jaar geldig. Hou er rekening mee dat het vaccin bij de eerste vaccinatie, pas 21 dagen na toediening werkzaam is. Zorg dus dat u minimum 3 weken voor vertrek uw kat laat vaccineren tegen hondsdolheid.

## **Vaccinatie van kittens**

Pasgeboren kittens (katten < 1 jaar) krijgen van hun moeder gedurende hun eerste levensweken afweerstoffen mee via de moedermelk. Deze antistoffen bieden slechts een tijdelijke bescherming aan de jonge kittens. Na het spenen dalen deze afweerstoffen echter snel, zodat uw kitten weer gevoelig wordt voor deze ziektes.

Vaccineren op dat moment zorgt voor een stimulatie van het eigen afweersysteem en de opbouw van een goede bescherming.

## **Vaccinatieschema zonder VacciCheck**

- De kitten vaccinaties vinden plaats op 7 weken – 9 weken – 13 weken – 26 weken. Nadien gebeurt de vaccinatie jaarlijks.
- Binnenkatten worden gevaccineerd tegen kattenziekte en niesziekte. Voor buitenkatten is het advies om ook tegen de leucose te enten.  
Reden?: Direct contact met andere katten is noodzakelijk om leucose te verkrijgen (vechten, elkaar likken, via speeksel, bloed, urine, ...)

## **Vaccinatieschema met VacciCheck**

- Met behulp van VacciCheck is het mogelijk om een vaccinatieschema op te stellen op maat van uw dier.
- VacciCheck is een bloedonderzoek waarbij er wordt gecontroleerd of uw kat voldoende antistoffen heeft tegen niesziekte en kattenziekte, en voor hoelang deze minimaal is beschermd.
- Waarom?: om de kittens zo min mogelijk inentingen te geven door ze op het ideale tijdstip te enten.  
Er zijn 2 protocols mogelijk bij kittens afhankelijk of de fokker op 7 weken een enting heeft gegeven of een VacciCheck heeft laten uitvoeren.  
1. VacciCheck is op 7 weken uitgevoerd bij fokker: elke 4 weken test herhalen om te kijken wanneer de maternale antistoffen bijna volledig verdwenen zijn. Dit is het ideale tijdstip om de enting te geven. Vier weken later kan met de test ook gekeken worden of het vaccin goed is aangeslaan. Voordeel: het kitten heeft meestal maar 1 enting gekregen in plaats van 3.  
2. VacciCheck op 11 weken als het kitten op 7 weken al een enting heeft gehad om te kijken of de maternale antistoffen voldoende laag zijn om de enting te geven. Indien twijfel of de antistoffen nog matернаal zijn OF reeds afkomstig zijn van de eerste enting kan het zijn dat aangeraden wordt om na 4 weken opnieuw te testen. De enting tegen

kattenziekte en niesziekte zal gegeven worden op het moment dat de maternale antistoffen verdwenen zijn. Vier weken later kan getest worden om te kijken of het vaccin goed aangeslaan is.

- Belangrijk! VacciCheck is enkel voor kattenziekte en niesziekte. De inenting en booster tegen leucose zijn nog steeds nodig

## **Vaccinatie van volwassen katten**

Ook bij de volwassen kat kunnen we werken volgens 2 principes:

- Indien de eigenaar wenst te vaccineren volgens het **traditionele schema** zal de volwassen kat jaarlijks een gezondheidscontrole en enting krijgen tegen niesziekte en driejaarlijks een enting tegen kattenziekte, niesziekte en leucose.
- Eigenaars die willen **enten volgens het VacciCheck principe** komen jaarlijks op gezondheidscontrole. Op basis van de titerbepaling beslissen we wanneer de kat moet worden geënt of een nieuwe vacciCheck wordt uitgevoerd. De driejaarlijkse enting tegen leucose blijft.

**Nog vragen? Twijfel dan niet om ons te contacteren:**

**Dierenkliniek Herckenrode**

**<http://www.dierenkliniekerckenrode.be>**

**e-mail: [info@dierenartsenherckenrode.be](mailto:info@dierenartsenherckenrode.be)**